

# Caso clinico

Alessandro Soria – Silvia Costarelli

San Gerardo Monza

# Anamnesi

- Donna, 70 anni, 84 Kg, 168 cm
- HCV+, genotipo 2, naive
- Cirrosi epatica Child B7 Meld 14
- In terapia con furosemide 25 mg e canrenoato 200 mg
- Frequenti episodi di erisipela associata a edemi declivi arti inferiori
- Eco addome: non lesioni focali, non segni di ipertensione portale, non splenomegalia
- EGDS: isolate ectasie venose esofagee

# Terapia

- Inizia sofosbuvir 400 mg + ribavirina 1200 mg con programma di 20 settimane di trattamento
- Dopo 4 settimane
  - riduce dose di RBV a 1000 mg, ottenendo stabilizzazione Hb attorno a 12 g/dL
  - Introduce lattulosio per incremento ammoniemia (con espressione clinica di confusione mentale)
  - ottiene RVR

# Eventi clinici

- Alla week 16: erisipela arto inferiore sx trattata con cotrimossazolo, e marcato incremento di bilirubina (fino a 7.8)
- A EOT: recidiva di erisipela trattata con levofloxacina
- A SVR4: recidiva di erisipela trattata con cefixima

# Bilancio conclusivo

- SVR4
- Child B7 → B8 (decremento di albuminemia sotto i 2.8)
- Meld 14 → 14
- Incremento posologia furosemide da 25 mg a 75 mg
- Marcato incremento di bilirubinemia, prevalentemente indiretta, in corso di trattamento, in particolare durante il primo episodio infettivo, poi parzialmente rientrato